



Guide d'utilisation à destination des professionnels de santé

Informations Générales

CinnaCandi® 7µg à base d'huile essentielle de Cannelle de Ceylan, comprimé muco-adhésif avec applicateur buccal est indiqué pour le traitement des **Candidoses buccales**.

Ce guide reprend les informations essentielles sur l'utilisation et les risques que vous devez connaître avant de prescrire et délivrer CinnaCandi®.

En complément, un guide a également été conçu spécifiquement pour les patients afin de les accompagner lors de la prise de leur traitement. Ils y trouveront des informations importantes concernant l'utilisation et la conservation de CinnaCandi®.

Pour plus d'informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique des médicaments :
<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Pour toute question complémentaire, notre service d'information médicale est à votre disposition.

Présentation de CinnaCandi®

CinnaCandi® est indiqué pour le traitement des candidoses buccales.

CinnaCandi® possède un **large spectre d'activité antifongique**, il est actif sur les espèces de Candida, y compris *C. albicans*, et aussi les espèces non albicans telles que *C. parapsilosis*, *C. glabrata* et *C. krusei*.

Les espèces de *Candida* les plus fréquemment rencontrées dans les candidoses buccales (*C. albicans*, *C. glabrata* et *C. krusei*) sont sensibles à CinnaCandi®.



Présentation des Patients cibles

CinnaCandi® est un médicament **réservé à l'adulte**.

CinnaCandi® peut être administré :

- aux **personnes âgées**
- **patients diabétiques**
- patients de type **immuno-déprimés** (VIH, Cancer)
- patients **sous traitement ATB ou immunosuppresseurs**
- personnes possédant des prothèses dentaires





Association possible avec les anti-coagulants oraux, les sulfamides hypoglycémiants, le cisapride, le pimozone et les alcaloïdes de l'ergot.

Recommandations concernant l'Administration

Sortir le comprimé du blister

Ouvrir le blister avec une paire de ciseaux au moment de l'utilisation de CinnaCandi® en découpant entièrement la languette la plus longue.

Retirer complètement l'opercule (partie imprimée) du blister. Sortir ensuite le comprimé avec applicateur du blister.



Le mettre en place

Le patient doit immédiatement placer le comprimé entier sur la gencive supérieure, juste au-dessus de l'incisive.

Retirer l'applicateur

Par un mouvement de rotation de l'applicateur, le comprimé placé et adhérent à la muqueuse, se détache de son applicateur.

Maintenir le comprimé en place pendant 30 secondes en appliquant une légère pression du doigt à l'extérieur de la lèvre supérieure.

Posologie

Application d'un comprimé buccal muco-adhésif une fois par jour, pendant 14 jours.

Il est préférable d'appliquer le comprimé le matin, après le brossage des dents.

CinnaCandi® peut être administré avec les aliments et les boissons.

Précautions d'emploi

CinnaCandi® devant être appliqué sur la gencive supérieure, juste au-dessus de l'incisive :

- Toutes les situations qui pourraient perturber l'adhésion du comprimé doivent être évitées telles que toucher ou appuyer à l'endroit où le comprimé est placé. Mâcher du chewing-gum doit également être évité
- Le comprimé ne doit pas être sucé, mâché ou avalé
- Si le brossage des dents est effectué au cours de la journée, il convient de prendre soin de ne pas toucher le comprimé et de se rincer la bouche avec précaution
- Si la bouche devient sèche, humidifier la gencive avant d'appliquer le comprimé muco-adhésif
- Si le comprimé tombe ou est avalé accidentellement dans les 6 premières heures, il doit être remplacé immédiatement
- Une ingestion accidentelle de CinnaCandi® peut survenir
Si CinnaCandi® est avalé accidentellement il est recommandé de boire un verre d'eau

Mises en garde

Médicament déconseillé :

- chez les femmes enceintes en raison d'absence de données expérimentales établies
- dans la population pédiatrique en raison d'absence d'expérience chez l'enfant

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ** dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au lait ou aux produits dérivés du lait
- Hypersensibilité à la Cannelle ou à l'un des composés contenus dans CinnaCandi

Une irritation locale a rarement été observée après l'application de CinnaCandi® mais comme avec tout autre médicament, des réactions d'hypersensibilités peuvent survenir.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C.

Elements à prendre en considération pour la prise en charge d'une **Candidose Buccale**.

Arbre décisionnel
Vidal, version 2016

