


Administration

Sortir le comprimé du blister

Ouvrir le blister avec une paire de ciseaux au moment de l'utilisation de CinnaCandi® en découpant entièrement la languette la plus longue.

Retirer complètement l'opercule du blister et sortir ensuite le comprimé avec applicateur du blister.



Le mettre en place

Placer immédiatement le comprimé entier sur la gencive supérieure, juste au-dessus de l'incisive.

Retirer l'applicateur

Par un mouvement de rotation de l'applicateur, le comprimé placé et adhérent à la muqueuse se détache de son applicateur.



Maintenir le comprimé en place pendant 30 secondes en appliquant une légère pression du doigt à l'extérieur de la lèvre supérieure.

Elimination

Lorsqu'ils ne sont pas complètement utilisés, les comprimés de CinnaCandi® accompagnés ou non de leur applicateur doivent être éliminés comme suit :

- Si le comprimé a été entièrement consommé, jetez l'applicateur dans un container d'élimination prévu à cet effet.

- S'il reste du médicament sur l'applicateur, placez l'unité CinnaCandi® sous l'eau chaude jusqu'à ce que le comprimé soit complètement dissout, puis jetez l'applicateur dans un container d'élimination.

Les médicaments non utilisés doivent être retournés à la pharmacie.



Guide d'utilisation à destination des patients




Pharm
essence

Votre Santé est l'essence
de notre travail

Informations Générales



Présentation de CinnaCandi®



Pharm
essence

Votre Santé est l'essence
de notre travail

CinnaCandi® est un médicament
réservé à l'adulte.

CinnaCandi® peut être administré :

- aux **personnes âgées**
- **patients diabétiques**
- patients de type **immuno-déprimés** (VIH, Cancer)
- patients **sous traitement ATB ou immunosuppresseurs**
- personnes possédant des **prothèses dentaires**

Médicament déconseillé
chez la femme enceinte et les enfants.

CinnaCandi® 7µg à base d'huile essentielle de Cannelle de Ceylan,
comprimé muco-adhésif avec applicateur buccal est indiqué pour le traitement des **Candidoses buccales.**

CinnaCandi® possède un **large spectre d'activité antifongique**, il est actif sur les espèces de Candida, y compris *C. albicans*, et aussi les espèces non albicans telles que *C. parapsilosis*, *C. glabrata* et *C. krusei*.

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer 1 comprimé 1 fois par jour pendant 14 jours à l'aide de l'applicateur buccal inclus dans l'étui.

Pour tout complément d'information, se référer à la notice ou demander conseil à votre pharmacien.

Si les signes cliniques persistent, consulter un médecin.

**TITULAIRE
FABRICANT / EXPLOITANT**

Pharmessence
BP26, Route de la Brèque
Zone Portuaire du Havre
76700 Harfleur

[http://laboratoirepharmes.wix.com/
pharmessence](http://laboratoirepharmes.wix.com/pharmessence)

Médicament autorisé
N° EU/XX